



Tomografia Computadorizada

Pescoço (partes moles, laringe, tireóide e faringe)

Prezado(a) paciente,
Para uma melhor avaliação de sua condição clínica, favor seguir o protocolo de orientações do exame solicitado.

Preparo:

- É necessário jejum absoluto de 4 horas, inclusive de água. No entanto, **qualquer medicação de uso contínuo, que não tenha sido suspensa por orientação do médico solicitante**, pode ser ingerida com um pouco de água.

- **DIABÉTICOS:** caso utilizem algum dos medicamentos abaixo**, deverão solicitar a autorização do médico que indicou o exame para suspender o uso 2 dias antes da realização do exame, devido à possibilidade de injeção do contraste endovenoso.

** CLORIDRATO DE METFORMINA, presente nos medicamentos: Avandamet, Aktos, Diaformin, Dimefor, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glifage, Glucofage, Glucoformin, Glucovance, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Starform, Teutoformin.

Tempo de Duração:

O procedimento dura, em média, 10 minutos. Após o procedimento com o uso do meio de contraste venoso, o paciente permanecerá em observação por 20 minutos.

Observações:

- Trazer exames anteriores da região a ser examinada, caso possua (essa orientação é imprescindível para adequada análise do exame).
- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia do exame.
- Chegar 20 minutos antes do horário agendado para procedimentos administrativos, preenchimento dos questionários clínicos e realização do preparo.
- Trazer o pedido médico.
- Não vir com adornos metálicos (jóias, bijuterias, grampos ou presilhas).